



Programma di immunizzazione scolastica per ragazzi del 3° anno di scuole superiori - informazioni per genitori

Che cos'è la malattia da meningococco?

La malattia da meningococco è una patologia non comune ma potenzialmente pericolosa per la vita. Questa malattia deriva da un'infezione batterica del sangue e/o delle membrane che collegano il midollo spinale e il cervello.

Nonostante possa essere curata con antibiotici, l'infezione può progredire molto rapidamente pertanto è importante rivolgersi subito al medico in caso di comparsa di sintomi della malattia da meningococco.

In qualsiasi momento, circa il 10 per cento delle persone in salute sono portatori sani del batterio del meningococco nel naso o nella gola, senza ammalarsi.

Come si diffonde la malattia da meningococco?

I batteri del meningococco si diffondono tramite secrezioni delle vie respiratorie (tosse, starnuti o baci). I batteri sopravvivono solo pochi secondi nell'ambiente.

La malattia si diffonde nella maggior parte dei casi solo tra contatti molto stretti, come soggetti che vivono sotto lo stesso tetto, contatti sessuali e bambini che frequentano lo stesso asilo per oltre quattro ore continue.

Perché il WA Health offre un programma di vaccinazione per ragazzi del 3° anno di scuole superiori?

La malattia da meningococco può colpire qualsiasi gruppo d'età. Tuttavia, alcuni dei tassi più alti di trasmissione e contagio da meningococco si verificano tra adolescenti e questo gruppo d'età può trasmettere batteri ai soggetti che sono a più alto rischio di contagio, tra cui i bambini piccoli.

Si prevede che vaccinare gli studenti del 3° anno di scuole superiori ridurrà la trasmissione dei batteri ad altri soggetti ed aiuterà ad evitare il contagio della comunità in genere.

Quale vaccino verrà utilizzato e quanto è efficace?

Verrà utilizzato il vaccino antimeningococco ACWY. Questo vaccino protegge da quattro sierogruppi del batterio del meningococco: A, C, W e Y. Il vaccino del marchio Nimenrix® verrà utilizzato in questo programma scolastico.

Questo vaccino è sicuro ed efficace. I programmi di vaccinazione antimeningococco ACWY sono stati somministrati agli adolescenti dai 13 ai 15 anni nel Regno Unito dal 2015 e agli adolescenti dagli 11 ai 12 anni negli Stati Uniti dal 2005 e non sono state riferite preoccupazioni significative. Il vaccino viene somministrato normalmente in una singola dose. Ulteriori dosi sono raccomandate per i soggetti a maggior rischio di contagio e coloro che viaggiano nei Paesi in cui la malattia è diffusa. Alcuni studi hanno dimostrato che l'efficacia del vaccino antimeningococco ACWY è dell'80-85% tra gli adolescenti.

Chi non deve vaccinarsi?

Ti preghiamo di avvisare i medici in caso di:

- **allergie gravi e potenzialmente pericolosi per la vita.**

Qualora tu abbia avuto una reazione allergica grave dopo una dose precedente del vaccino antimeningococco ACWY o in caso di allergia grave a qualsiasi componente del vaccino, si raccomanda di non sottoporsi alla vaccinazione. Il fornitore è tenuto a comunicare gli ingredienti del vaccino su richiesta.

- **gravidanza o allattamento.**

I vaccini antimeningococco non sono solitamente raccomandati per donne in gravidanza o durante l'allattamento ma possono essere somministrati qualora prescritto clinicamente. Ti preghiamo di discuterne ulteriormente con il tuo medico in caso di gravidanza o allattamento.

Quali sono gli effetti collaterali del vaccino?

Nel caso di somministrazione di qualsiasi farmaco, inclusi i vaccini, vi è la possibilità che si verifichino effetti indesiderati comuni. Questi sono solitamente lievi e scompaiono da soli. È possibile anche che si verifichino reazioni gravi, ma queste sono rare. Vi è una piccolissima possibilità che il vaccino comporti danni gravi o morte. Non si può essere contagiati dalla malattia da meningococco tramite il vaccino.

Gli effetti indesiderati comuni includono dolore, rossore e gonfiore nel sito dell'iniezione, febbre, irritabilità, sonnolenza, riduzione dell'appetito, mal di testa, eruzione cutanea e nausea. Tuttavia, le reazioni indesiderate gravi sono rare.

I vaccini sono controllati costantemente per garantire la loro sicurezza ed efficacia. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei vaccini e gli effetti collaterali comuni e rari, ti preghiamo di consultare: healthywa.wa.gov.au/immunisation



Il presente documento può essere fornito in formati alternativi su richiesta per persone con disabilità.

Prodotto dal Communicable Disease Control Directorate
© Department of Health 2023

Il copyright del presente materiale appartiene allo Stato del Western Australia, salvo diversamente indicato. Fatta eccezione per la riproduzione a scopo di studio, ricerca, critica o recensione, come consentito dalle disposizioni del *Copyright Act del 1968*, nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o riutilizzata per qualsiasi scopo senza l'autorizzazione per iscritto dello Stato del Western Australia.

In caso di reazione grave, a cosa devo far attenzione?

Presta attenzione a qualsiasi reazione come segni di reazione allergica grave, febbre molto alta o comportamento strano. I segni di reazione allergica grave includono orticaria, gonfiore del viso e della gola, difficoltà respiratoria, accelerazione del battito cardiaco, vertigini e debolezza, solitamente da pochi minuti fino ad alcune ore dopo la vaccinazione. In caso di reazioni gravi, chiama un'ambulanza o recati presso il pronto soccorso più vicino.

Cosa devo fare?

Il paracetamolo può aiutare a ridurre la febbre o il dolore leggero e un panno bagnato fresco può ridurre il dolore nel sito dell'iniezione. Consulta il medico o recati nel pronto soccorso più vicino in caso di reazioni gravi o inaspettate.

O chiama **healthdirect Australia** all'1800 022 222.

Tutti i fornitori di vaccini nel WA sono tenuti per legge a segnalare una reazione avversa dopo l'immunizzazione. I genitori possono anche segnalare preoccupazioni riguardanti qualsiasi reazione grave dopo l'immunizzazione. Scopri di più su healthywa.wa.gov.au/WAVSS o chiama il 6456 0208.

Ulteriori informazioni

In caso di domande sulla vaccinazione antimeningococco, contatta **healthdirect Australia** allo 1800 022 222 o il tuo fornitore locale utilizzando i dati di contatto forniti sul retro della busta contenente i tuoi documenti di consenso.